


Riesgo de exposición a la viruela símica o del mono por actividad

La viruela símica o del mono es una enfermedad rara causada por la infección con el virus de la viruela del mono. La viruela del mono puede causar fiebre, dolor de cabeza, dolores corporales, ganglios linfáticos inflamados y una erupción cutánea.

Riesgo Alto



Contacto de piel a piel



Contacto sexual e íntimo



Telas contaminadas
(ropa de cama, toallas, ropa, etc.)

Riesgo Medio



Otros contactos íntimos*
(abrazar, besar, caricias,
masajear, etc.)



Compartir
Bebidas



Asistir a eventos abarrotados
en espacios interiores con
personas que no están
completamente vestidas



Contacto con
animales
infectados†

Riesgo Bajo



Compras de
comestibles



Uso de las instalaciones
de los baños públicos



La Natación
(piscinas y jacuzzis)



Hacer ejercicio en
el gimnasio

Lo siguiente todavía se está investigando sobre la viruela símica o del mono:

- Si se puede propagar cuando alguien no tiene síntomas (es decir, asintomático)
- Con qué frecuencia se propaga a través de las secreciones respiratorias
- Si se puede propagar a través del semen, los fluidos vaginales, la orina o las heces

* Incluye contacto cara a cara prolongado con una persona infectada (3 horas o más).

† Es posible que las personas contraigan la viruela símica o del mono de animales infectados al ser arañados o mordidos, al preparar o comer carne, o al usar productos de un animal infectado.

Monkeypox@acgov.org | <https://MPX.acgov.org/> | (510) 268-2101

